

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Регистрационный номер

ЛП-№(000329)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Арнигель®

Лекарственная форма

Гель для наружного применения гомеопатический

Состав (на 100 г)

Активный компонент:

Arnica montana (арника монтана) (настойка гомеопатическая матричная) 7 г

Вспомогательные вещества:

Карбомер 0,90 г, натрия гидроксида раствор 10% 1,70 г, этанол (спирт этиловый) 96% 20 г,
вода очищенная 70,40 г

Описание

Прозрачный однородный гель от жёлтого до жёлто-оранжевого цвета со слабым запахом

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Монокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентом, входящим в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Ушибы, синяки, мышечная боль вследствие чрезмерной физической нагрузки

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Нарушение целостности кожных покровов, мокнущий дерматит и другие кожные заболевания в области предполагаемого нанесения препарата.

Противопоказано наносить на слизистые оболочки.

Детский возраст до 1 года (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности противопоказано (в связи с отсутствием клинических данных у данной категории пациентов).

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Детям от 1 года и взрослым небольшое количество геля нанести равномерным тонким слоем на кожу болезненных участков и втирать легкими массирующими движениями до полного впитывания. Процедуру проводить 1-2 раза в течение 5-7 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; сухость и раздражение кожи. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами, применяемыми при данном заболевании. Не рекомендуется одновременное применение препарата с антикоагулянтами непрямого действия.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Если после нескольких дней лечения улучшение не наступает или появляются побочные эффекты, следует проконсультироваться с врачом.

Возможно появление сухости и раздражения кожи при частом применении в связи с содержанием в препарате этанола (спирта этилового). Не следует наносить гель под окклюзионную повязку.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Гель для наружного применения гомеопатический. По 45 г или 120 г в алюминиевую трубу, покрытую изнутри эпоксифенольным лаком, запечатанную алюминиевой фольгой, с завинчивающейся полиэтиленовой крышкой Каждую трубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Производитель

БУАРОН, 2, авеню де л`Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франция

Место производства

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Представитель в России/ организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва,

ул. Долгоруковская, д.7

Тел. (495) 956 08 10,

факс (495) 956 08 14